

この説明文書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

# 天然型ビタミンE・ビタミンC・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>配合 ピラピタンEC-S

第3類医薬品

ビタミンEC主薬製剤

ピラピタンEC-Sは天然型ビタミンE、ビタミンC、持続型ビタミンB<sub>2</sub>及びビタミンB<sub>6</sub>を配合した製剤です。

ビタミンEは血行をよくするビタミンとしてよく知られており、動脈硬化の原因となる過酸化脂質の生成を防ぎ、また、ホルモンのバランスの乱れを調整する大切なビタミンです。

本剤はこのビタミンEに更にビタミンC、ビタミンB<sub>2</sub>及びビタミンB<sub>6</sub>を配合した、芳香と酸味のある、服用しやすい顆粒剤です。



## 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、下痢

### ■効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

(必ず裏面もお読みください)

## ■用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	1～3回 〔なお、2回の場合は、朝夕、 3回の場合は朝昼晩に服用 してください。〕
11才以上15才未満	2/3包	
7才以上11才未満	1/2包	
3才以上7才未満	1/3包	
3才未満	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■成分・分量

1日量(3包)中

1包(2,200mg)

成分	分量	はたらき
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE)	300mg	末梢血管の血行をよくする
アスコルビン酸(ビタミンC)	2,000mg	色素沈着を防ぐ
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg	肌を健康に保つ
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	50mg	肌を健康に保つ

添加物として、デキストリン、アルファー化デンプン、白糖、ショ糖脂肪酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸2K、香料、デンプン、デンプン部分加水分解物を含有します。

### <成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。が、ビタミンB<sub>2</sub>によるものですから心配ありません。

## ■保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
4. 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  
 東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10  
 電話：076-478-5580 受付時間：9:00～16:00(土、日、祝祭日を除く)