

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

新ノーカインは、痛みと発熱をしずめる白い錠剤です。

解熱鎮痛薬 **新ノーカイン** 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください。  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
  2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
  3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります)
  4. 服用前後は飲酒しないでください。
  5. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)  
(4) 高齢者  
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(6) 次の診断を受けた人  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

症状の名称	症状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面もご覧ください)

■効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

■用法・用量

右表の量を1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は、4時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15歳以上)	2錠	1日3回を限度 7歳以上15歳未満 7歳未満の幼児
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満の幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



■成分と作用

1日量(6錠)中

成分	6錠中	作用
アセトアミノフェン	800mg	いたみをやわらげ、発熱症状をしずめます
エテンザミド	900mg	
プロモバレルリル尿素	600mg	いたみをおさえる働きをたずけます
無水カフェイン	150mg	いたみをおさえる働きをたずけるほか、頭痛をやわらげます

添加物として結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、二酸化ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤はまれに錠剤の表面に白色の針状結晶が生じることがありますが、これは有効成分の結晶であり、異常ではありません。

■保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 配置期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、下記をお願いいたします。

布亀株式会社 お客様相談室  
TEL : (0798) 35-9985  
受付時間:午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **布亀株式会社**  
兵庫県西宮市今津二葉町3番6号  
製造販売元 **新新薬品工業株式会社**  
富山県富山市今市324番地