

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要ときに読めるよう大切に保管して下さい。

くしゃみ・鼻水・鼻づまり・なみだ目の緩和に

鼻炎用内服薬 **鼻炎カプセルA** 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
 - (3) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) かげ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。緑内障、腎臓病
 - (9) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振 めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
精神神経系	
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かげ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期運用しないでください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
急性汎発性発疹性薬疹	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青ざり、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますが、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

(裏面につづく)

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)。

■用法・用量

次の量を1日3回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2カプセル	3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満の幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 右図のようにカプセルの突っ出ているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。)



■成分・分量

6カプセル(大人の1日最大服用量)中

成分	6カプセル中	作用
クロロフェニラミンマレイン酸塩	12mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまり等のアレルギー症状をおさえます。
ブノイドエフェドリン塩酸塩	168mg	鼻粘膜の血管収縮作用により炎症をしずめます。
ペラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻みずやなみだの過剰な分泌をおさえます。
無水カフェイン	150mg	頭重をやわらげます。

添加物として、結晶セルロース、乳糖水和物、ハレシヨアンパン、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、カプセルに青色1号、ラウリル硫酸ナトリウム、酸化チタン、ゼラチンを含んでいます。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 配置期限(外装に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本剤につきましてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

布竜株式会社 お客様相談室

TEL: (0798) 35-9985

受付時間: 午前9:00～午後5:00(土、日、祭日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元 布竜株式会社

兵庫県西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 新新薬品工業株式会社

富山県富山市今市324番地