

布亀パスEこりと痛みに

● 効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

● 有効成分・分量 本品1.0m²(膏体144.81g)中

サリチル酸メチル	9.0 g
ノニル酸ワニリルアミド	0.01 g
dL-カンフル	1.8 g
ハッカ油	1.2 g
l-メントール	4.5 g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.5 g

添加物として

ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

▣ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 本人又は家族がアレルギー体质の人。

(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ・痛み

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

第3類医薬品

● 用法及び用量

1日1~2回、ライナーをはがし、患部に貼る。

【用法及び用量に関する注意】

(1) 用法及び用量を厳守してください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

(4) 皮ふのとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさせてください。

(5) 皮ふの弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(6) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質がかわります。)

(4) 開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。

(5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

内容量 大判 12.4cm×7.0cm・10枚入 小判 7.4cm×5.2cm・8枚入

計18枚 ￥550+税

発売元 布亀株式会社 西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 大協薬品工業株式会社 富士市水橋富士173

お客様相談窓口 電話:076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

