



消炎鎮痛パップ剤

第3類医薬品 〈伸縮タイプ〉

テイハップ®N



チャック

肩こり 腰痛
筋肉痛 打撲
捻挫に

冷感
微香性



3sheets

開封後はチャックをきちんとしめて保管してください。

ここからハサミでお切りください。



チャック

……からハサミでお切りください。

開封後はチャックをきちんとしめて保管してください。



テイハップ[®]N 消炎鎮痛パップ剤

第3類医薬品

【テイハップNの特長】

1. 4つの成分を配合し、優れた鎮痛・消炎効果を発揮します。
2. 貼っても臭いが気にならない微香性です。
3. のびのびタイプで、肌にぴったりフィットします。
4. 含水性にすぐれ、高い冷却効果を発揮します。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書(アルミ袋)を持って医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛



肩こり
腰痛



打撲
捻挫



筋肉痛
関節痛

■ 使用法

1日1～2回、表面のプラスチックフィルムをはがして、患部に貼付してください。

＜使用法に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部が汗等でぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (3) 使用法を厳守してください。

■ 成分・分量 (100g(1,000cm²)中)

サリチル酸グリコール1.0g、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)0.3g、グリチルリチン酸0.02g、ℓ-メントール0.2g(添加物として、水酸化Al、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒマシ油、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、カルメロースNa、無水ケイ酸、プロピレングリコール、D-ソルビトール、グリセリン、ポリソルベート80、酒石酸、エドト酸Naを含有します。)

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間：午前9:00～午後5:00
(土、日、祝日を除く)

使用期限

副作用被害救済制度 副 装 3枚入 [7.5cm×14.0cm]
☎ 0120-149-931

¥300+税



発売元 布亀株式会社

西宮市今津二葉町3番6号
電話0798-35-2121

製造販売元 ティカ製薬株式会社

〒930-0982 墨江市荒川一丁目3番27号