



nunokuni

布亀パップ コリシートID

肩・腰・関節・筋肉の

痛み

ピッタリはれる粘着シート1体型

インドメタシン配合



波形スリット

タコタコはがせるライナー

快適フィット

パップ剤特有のにおいが少ない

肌にやさしい

透気性の良いメッシュ粘着シート

セルフメディケーション

税 控除 対象

第2類医薬品

5枚入

開封後はファスナーを閉めて保管してください。





→ 切り取り線

開封後はファスナーを閉めて保管してください。

布電パップ コリシートID

外用鎮痛消炎薬 第2類医薬品

販売名：コリシートID

使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 11歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 潰瘍、かみれ、傷口。

(3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないこと

※ 注意すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外装を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副反応	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外装を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用期限

製造番号

成分及び分量 每片100g中 インドメタシン0.375g

添加物として、D-ソルビール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、*l*-メントール、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、エタノール、モノオレイン酸ノルピタン、黄色205号、黄色1号を含有します。

効能又は効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、挫傷

用法及び用量

患部(患)のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

(用法及び用量に関連する注意)

(1) 用法及び用量を遵守してください。(2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 皮膚の弱い人は、使用前に胸の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(4) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。(5) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。(6) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。(7) 貼付後、はがす際まれに粘着シートと膏体部分が分離する場合がありますが、効果に影響はありません。

(保管及び取扱い上の注意)

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。),(4) 開封後はファスナーを閉めて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

● お問い合わせ先 大智薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話 075-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土、日、夜日を除く)

副作用報告制度 電話 03-20-149-931

支店 三 布電機株式会社 西宮市今津二丁目2番10号

支店 大 大智薬品工業株式会社 山形市本橋南173

5枚入 (11.9cm×7.7cm)



4 940794 461853



T31